

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
02.08.13 № 684
Реєстраційне посвідчення
№ UA/8738/01/01
ЗМІНИ ВНЕСЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
01.12.2016 № 1299

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
АРІДА® СУХА МІКСТУРА ВІД КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 19,55 г порошку містять: алтейного кореня екстракту сухого (*Althaeae radix extractum siccum*) – 4,0 г; натрію гідрокарбонату – 2,0 г; солодкового кореня екстракту сухого (*Glycyrrhizae radix extractum siccum*) – 1,0 г; амонію хлориду – 0,5 г; анісової олії – 0,05 г;
допоміжні речовини: натрію бензоат, цукор кондитерський.

Лікарська форма.

Порошок.

Порошок бурувато-сірого кольору з запахом масла анісового. У процесі зберігання можливе збивання порошку у грудочки або утворення твердої пористої маси, які повинні розпадатись при розведенні водою. Водна суспензія препарату (1:10) має забарвлення від світло- до темнокоричневого.

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «Тернофарм».

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальний, секретомоторний засіб.

Код АТС R05C A10.

Препарат стимулює відхаркування. Механізм дії зумовлений полегшенням відділення слизу, поліпшенням його виведення (збільшення мукоциліарного кліренсу).

Показання для застосування.

Препарат застосовувати як протикашльовий, протизапальний і відхаркувальний засіб у комплексному лікуванні запальних захворювань дихальних шляхів.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Органічні ураження серця (міокардит, перикардит, інфаркт міокарда), артеріальна гіпертензія; порушення функції печінки та нирок; гіпокаліємія; тяжкий ступінь ожиріння.

Особливі застереження.

Аріду® Суху мікстуру від кашлю для дітей слід призначати у комплексній терапії. Для покращення розрідження і відділення мокротиння рекомендується при прийманні відхаркувальних, особливо секретомоторних препаратів призначати внутрішньо велику кількість теплої рідини. Хворим на цукровий діабет слід проконсультуватися з лікарем перед застосуванням препарату.



Застосування у період вагітності або годування груддю.

Препарат застосовувати дітям віком від 1 до 18 років. У період вагітності або годування груддю лікування призначає лікар за умови, коли передбачувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Препарат застосовувати дітям віком від 1 до 18 років. Препарат не впливає на здатність керувати транспортними засобами та роботу з іншими механізмами.

Діти.

Рекомендовано до застосування дітям віком від 1 до 18 років.

Спосіб застосування та дози.

Перед застосуванням суху мікстуру розводити кип'яченою та охолодженою водою до позначки на флаконі (200 мл).

Призначати внутрішньо після вживання їжі, дітям віком від 1 до 6 років – по 1 чайній ложці мікстури 4-5 разів на добу, дітям віком від 6 років – по 1 десертній ложці 3-4 рази на добу. Перед вживанням мікстуру збовтувати. Розведену мікстуру зберігати протягом 10 днів при температурі не вище +8 °С.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально залежно від досягнутого ефекту та характеру комплексної терапії.

Передозування.

Нудота, блювання. Передозування та тривале застосування (більше 2 місяців) може викликати порушення водно-електролітного балансу, у результаті чого можливий розвиток гіпокаліємічної міопатії та міоглобінурії. Можливе посилення побічних ефектів.

Побічні ефекти.

В окремих випадках можливі алергічні реакції, шкірні висипання. Підвищення артеріального тиску, гіпокаліємія, свербіж, гіперемія шкіри, утворення набряків.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Однчасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин), тіазидними та петльовими діуретиками, адренкортикостероїдами та проносними засобами може посилити гіпокаліємію.

Не рекомендується застосовувати разом з протикашльовими засобами.

Термін придатності.

1 рік.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 19,55 г у флаконі №1.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Жест уздержено
[Підпис]

