

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ЕХІНАЦЕЇ НАСТОЙКА

Склад:

діюча речовина:

1 флакон містить: настойки кореневищ з коренями ехінацеї пурпурної сухих (*Echinacea purpureae rhizoma et radix*) (1 : 10) (екстрагент – етанол 50 %) 50 мл;
допоміжні речовини, крім екстрагенту, відсутні.

Лікарська форма. Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина червонувато-коричневого кольору. У процесі зберігання допускається утворення осаду.

Фармакотерапевтична група.

Цитокіни та імуномодулятори. Код АТХ L03A X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Комплекс діючих речовин підвищує фагоцитарну активність нейтрофілів і макрофагів, стимулює синтез інтерлейкіну-1, стимулює трансформацію В-лімфоцитів у плазматичні клітини, покращує функції Т-хелперів. Інулін, лавулоза та бетаїн покращують процеси обміну, особливо в печінці та нирках. Має протівірусні, антибактеріальні, протимікотичні властивості.

Фармакокінетика. Не вивчалась.

Клінічні характеристики.

Показання.

Застосовувати у складі комплексного лікування імунодефіцитних станів при хронічних рецидивуючих запальних захворюваннях різної локалізації. Стан після антибіотикотерапії, цитостатичної, імунодепресивної, променевої терапії. Початкові прояви ГРВІ, при тривалому застосуванні антибіотиків. Для місцевого лікування ран, що тривалий час не загоюються.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів лікарського засобу або до рослин родини складноцвітих; захворювання сполучної тканини (колагенози), розсіяний склероз та інші аутоімунні захворювання.

Прогресуючі системні захворювання (туберкульоз, цукровий діабет), захворювання лейкоцитарної системи крові (лейкоз, агранулоцитоз), онкологічні захворювання, ревматизм, СНІД, ВІЛ-інфекції, системний червоний вовчак, імуносупресія або імунодефіцит первинний та інші хронічні вірусні захворювання.

Період вагітності або годування груддю. Дитячий вік до 12 років.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Унаслідок імуностимулюючої дії ехінацеї препарат може зменшувати ефективність препаратів, які чинять імунодепресивну дію.

Препарат не рекомендується застосовувати одночасно з препаратами з гепатотоксичною дією, такими як аміодарон, метотрексат, кетоконазол, стероїдні препарати.

